

Cómo mejorar los resultados del tratamiento del cáncer del útero.

Por Kammiker, di Viena

El autor expone los resultados y los métodos de la Clínica de Peham en Viena.

De 1921 a 1925 las mujeres admitidas por cáncer 60 í eran operables y 40 inoperables. Sobre el conjunto 28\$ son curadas después de 5 años por lo menos. Pero si se distingue los dos grupos, los casos operables han dado 44.7 por 100 de curaciones datando de 5 años y los inoperables 5.5 por 100.

¿Como mejorar estos resultados? Primero convendría que las mujeres advertidas consultaran lo más pronto posible; los médicos deberían investigar más para encontrar el cáncer al principio y en caso de duda enviar las enfermas al especialista inmediatamente.

La operación practicada en Peham es siempre la histerectomía vaginal amplia y Kanmiker, insiste sobre que esta operación, que puede ser muy extendida, no debe ser ejecutada sino por cirujanos que tengan experiencia. La

intervención le ha dado 7% de mortalidad operatoria, cifra que no podrá bajarse notablemente. Después de la curación operatoria 7% murieron de afecciones intercurrentes y 40% muertos por recidivas. Como bajar esta ; importantes series comparativas han demostrado que la tasa de curaciones después de 5 años se elevaba en 16% cuando se aplica radioterapia profunda después de la operación; hay entonces en este procedimiento un progreso cierto. Es también muy importante despistar precozmente las recidivas. Para ello, un servicio se ha organizado en Peham para mantener el contacto con los operados y con su médico tratante; hacen volver los enfermos sistemáticamente a intervalos regulares ó si están muy lejos hacerlos examinar por su médico. Se puede llegar así a tratar por el radio ó los Rayos X recidivas cuando es tiempo todavía.

S OBERLIN.