

### La autouroterapia en el catarro de heno

TRONCHON y G. MARTINAUD expusieron en la *Soc. des Sciences Méd. de Franche-Comté* (sesión del 24 de noviembre de 1930) la observación del primero de estos autores afecto de un catarro de heno sumamente tenaz. Este paso había sido ya tratado con la auto-hemoterapia con resultados mediocres, y después con diez inyecciones intradérmicas de peptona seguidas de intensas reacciones dolorosas locales y una vez un síncope.

Este año intentóse la desensibilización con la autouroterapia, según la técnica de JAUSION, la cual no produce ninguna reacción y no es peligrosa.

El 26 de mayo de 1930 habían comenzado las crisis de catarro de heno, que se iban sucediendo con una intensidad tal, que impedían al enfermo dedicarse a sus ocupaciones.

En pleno período de asma nasal, el 2 de junio recogieron 40 cc. de orina en un recipiente es-

téril, siendo sometido durante veinte minutos a 120°, y después, repartidos en ampollas estériles de 2 a 5 cc.

Decidióse observar una gran prudencia, y en lugar de empezar con dosis de  $\frac{1}{2}$  a 1 cc, se comenzaría con  $\frac{1}{4}$  de centímetro cúbico. El 4 de junio" inyectóse esta dosis debajo de la piel; el 6 de junio llegóse hasta  $\frac{1}{2}$  cc; los días 8, 10 y 12 de junio aumentóse hasta 1 cc; 10 y 12 de junio aumentóse hasta 1 cc; el 14, 2 cc; el 18, el 23 y el 19 de julio, 5 cc, no observándose reacción local alguna, ni fatiga general, ni ningún incidente.

Sólo las dosis de 5 cc ejercieron influencia beneficiosa. En efecto, el 19 de junio tuvo el paciente aún unos veinte estornudos, pero fue la última vez, en tanto que los años anteriores las crisis intensas continuaban hasta octubre. Desde entonces, ni conjuntivitis ni estornudos, a pesar de los frecuentes paseos en pleno

campo, contactos repetidos con heno recientemente cortado, etc. Consecutivamente a esta comunicación, BIERER ha dicho haber visto curar una urticaria, consecutiva a una disentería amibiana, con el mismo método. MARTINAUD dijo no haber observado nunca incidentes en unos

treinta casos tratados con la autoterapia y haber visto sobre todo un éxito rotundo, -sin ningún régimen, en un caso de eczema solar. Citóse también el caso de un brote intenso y tenaz de deshidrosis de los pies curado con el mismo tratamiento.

---

### Tratamiento de la Enterocolitis Muco-Membranosa

---

Durante las crisis dolorosas permanecer en reposo en cama, colocando sobre el vientre compresas húmedas y calientes, recubiertas de tafetán y renovadas cada dos horas.

Como alimentación caldo de legumbres.

Dar belladona o atropina por vía bucal:

Extracto belladona . . 0.01 gramo

Para 1 píldora.

Una cada hora y media hasta que se calme el dolor. A veces es necesario dar 6, 8, y hasta 10 píldoras en las 24 horas:

Sulfato de atropina 0.004

Agua destilada.... 100 grs.

3 a 6 cucharadas de café en las 24 horas.

Cuando resisten los dolores, administrar un enema de láudano: XV gotas; pero el láudano tiene el inconveniente de constipar a estos enfermos que ya de por sí tienen tendencia a la constipación.

Esta última cede, en general, a los aceites de parafina: una cucharada de sopa antes de las comidas; o al aceite de ricino: una cucharada, de postre en la

mañana.

Se puede asociar al aceite de ricino el jarabe de belladona:

Aceite de ricino... 100 grs.

Jarabe de belladona 50 „

Una cucharada de postre en ayunas.

Los granos de lino de psyllium a la dosis de una cucharada de sopa en las comidas, el agar-agar a la dosis de una cucharada de postre o de .sopa, prestan servicio.

Los enemas aceitosos son excelentes; hacer cada dos o tres noches un pequeño enema con 6 o 7 cucharadas de sopa de aceite de olivas tibio y puro, inyectado lentamente.

A estos enemas puede agregarse X gotas de tintura de belladona.

Mientras las causas morales del espasmo no hayan desaparecido, el alimento será en general mal soportado. Se le prescribirá papillas con caldo de legumbres, pastas, purés, compotas, pescados magros, aves, cremas cocidas, pasteles de sémola. (S. R. Journal des Praticiens, 31 de enero 1931).