
Fibromatosis Salpingitis Bilateral Crónica y Degeneración Escleroquística de los Ovarios

M. de C. de 48 años, casada, de oficios domésticos, vecina de esta ciudad, ingresa al primer Servicio de Cirujía de Mujeres del Hospital General el 28 de julio de 1931, por un fuerte dolor en el vientre y una hemorragia uterina abundante.

Al examen, la enferma cuenta que desde hace diez meses se le **suspendió** la menstruación, pero que el 2 de julio le volvió con

defectuoso y a una enfermedad activa. La sífilis es la causa principal de estas tres taras por las razones siguientes:

(1) Muchas deformaciones congénitas son el resultado obvio de la sífilis. Se considera que la sífilis es probablemente la única enfermedad que puede ser transmitida de padre a hijo antes de nacer éste.

(2) Se considera que la sífilis es la causa probable de la mayoría de las enfermedades y neuroses del sistema nervioso. Muchos defectos de lenguaje debidos a neurosis funcionales son en realidad una forma de paresia local.

(3) La sífilis ha sido la más importante y la más activa de las enfermedades que atacan a los órganos de los sentidos, incluyendo el de la palabra articulada.

abundancia y una duración de ocho días; estuvo tres días sin ella y luego le volvió con la misma abundancia, apareciendo entonces un dolor en la región hipogástrica con irradiación hacia los lombos.

A la inspección se nota un vientre ligeramente prominente; a la palpación doloroso, haciendo difícil una exploración por el tacto combinado. En la vulva se encuentra un escurrecimiento de sangre que al poner el especulum se constata su proveniencia uterina.

La enferma ha menstruado siempre muy bien; ha tenido seis hijos de término.

La reacción de Kahn es positiva; más 4. Ha tenido tratamiento específico hace un año. Fue operada de hemorroides hace un año y curada completamente.

Sin datos suficientes para hacer un diagnóstico firme, resolví practicar una laparatomía exploradora.

Encontré dos enormes bolsas de piosalpingitis, un útero fibromatoso con un fibroma, como una nuez, pediculado al fondo, y 4 del tamaño de un huevo intersticiales; un quiste del ovario izquierdo y una degeneración escleroquística del derecho.

Hice una histerectomía abdominal subtotal con extirpación de los anexos.

Por haberse roto una de las

bolsas de pus, dejé un drenaje de Mikulicz.

El mismo día de la operación la enferma se coloca en posición de Fowler, se le pone un Murphy e inyecciones de aceite alcanforado.

La temperatura oscila los días siguientes entre 37.95 y 38.75.

El Mikulicz se retira en parte a las 48 horas y el resto a las 72, colocando después un tubo de caucho en el Douglas por la herida abdominal.

Al cuarto día la enferma se queja de dolor torácico izquierdo, disnea y expectoración herrumbrosa. Al examen físico se constata la presencia de una neumonía izquierda que con ventosas, aceite alcanforado, anti-sépticos respiratorios y suero antineumónico cede al sexto día.

La paciente sale completamente curada del Hospital el 25 de agosto, 27 días después de la operación.

COMENTARIO

Nada de interesante tendría el caso referido si todos los sínto-

mas de una salpingitis, de un fibroma o de una degeneración quística de los ovarios los hubiéramos encontrado en una forma mas o menos completa y sometidos al gran rigor de la evolución; pero no; se trata de una mujer de 48 años, que hace uno no menstrua, que siempre regló normalmente; sin flujo purulento, sin dolores, sin acceso de salpingitis aguda, sin abortos, a pesar del Kahn positivo, que repentinamente es atacada -de una metrorragia fuerte de ocho días de duración, reposo de tres días y luego, vuelta prosiguiendo veinte días, hasta el de la operación.

Mi primera impresión fue de que se trataba de un fibroma, por la hemorragia y por sentir una tumefacción en el Douglas de difícil apreciación ya que el tacto combinado a la palpación abdominal era imposible por la contractura abdominal. Por esto creí encontrarme con un síndrome abdominal cuya naturaleza no podía calificar y resolví una laparatomía inmediata.

Las bolsas purulentas serían recientes. De ninguna manera.

La enferma no ha tenido parto, aborto ni infección gonococcica, ni general y luego ningún accidente febril, ni doloroso; su estado general magnífico.

Serían los fibromas los causantes de la hemorragia. Muy probable, pero difícil de probar que solo ellos; eran unos intersticiales y otros subperitoneales ninguno submucoso.

O bien la ovaritis escleroquistica será la responsable del episodio hemorrágico.

Las tres afecciones son capaces de presentar el síntoma metrorragia y hallándose las tres no podemos afirmar cual de ellas fue.

Pero no es esto lo que ha llamado mi atención ni despertado la curiosidad, sino el síndrome doloroso abdominal inferior con contractura, sin timpanismo, sin vómitos, sin detención de materias ni de gases y sin temperatura; sin torción de ningún pedículo, sin apendicitis aguda ni crónica.

Todas las molestias cesaron después de la intervención y a no haberse presentado una neumonía de carácter benigno el postoperatorio hubiera sido de lo más agradable.

Muchísimos son los casos que como este se presentan en la clínica sin grandes síntomas de airona, y que una simple laparatomía salva todos los riesgos de muerte cuando el diagnóstico es dudoso o impracticable.

Nuestra experiencia se afirma más y más cada día en favor de las intervenciones inmediatas sea con diagnóstico o sin él.

Cuando lo hemos hecho por la segunda eventualidad ha sido con el mayor beneplácito, pues siempre hemos encontrado la causa del mal y su curación.

S. PAREDES P.

Tegucigalpa, septiembre de 1931.

Cuando en una mujer que se **acongoja** de su infecundidad después de algunos años de matrimonio, no descubris por un examen minucioso **ninguna** causa **apreciable**, no os dejéis intimidar por la actitud triunfan Le del marido, obeso y **pretencioso**, que está al lado de ella, testificando que una prueba reciente no deja ninguna duda sobre sus aptitudes para la procreación. Ordenadle leer el documento: encontraréis frecuentemente en superlativo la reproducción del verso bien conocido de Virgilio: "**Aparent rárissimum nantes**" ingeniosamente rodeado por un jefe de Laboratorio **inteligente**, fórmulas destinadas a salvaguardar el amor propio del **macho**. El hombre cuyas facultades genésicas no dejan nada que desear, no piensa invocar el concurso de un **microspopio**. — *Siredey*.

Qué de lesiones del pulmón no son visibles al simple examen radioscópico: Para percibir las una radiografía es indispensable y la radioscopia, en semejante caso, riesgo de dar una falsa seguridad. — *Robert Debré*.