

## Atenuación del dolor en el parto

Hans Schultze: *Atenuación del dolor en el parto.* — Zbl. Gynak., 46, 1932. El método, que se usa desde 1927 es el de E. Kahn (núm. 37 de 1927 del Zbl. Gynak..)

Consiste en la administración de una *enema* de una mezcla en determinadas proporciones de *éter sulfúrico puro, aceite de parafina y aceite de cacao.*

Kahn recomendaba administrar a la parturienta 0,10 de *luminal* por vía oral y 0,01 de *morfina* subcutáneamente.

El autor refiere los resultados obtenidos del método desde 1927 a 1931, en 561 partos. Hubo analgesia completa con amnesia retrógrada de los dolores del parto en 27,5 por 100 de los casos; en 52 % se comprobó gran atenuación de los dolores; en 20 por 100 *Óio* atenuación ligera y en 0,4 por 100 no se consiguió ninguna influencia apreciable.

Así, pues, en el 80 por 100 de los casos, se obtuvo un resultado y en el 20 por 100 el efecto fue\* deficiente. La analgesia completa con ausencia total de los dolores se observó en más del 27 por 100 de las parturientas

La enema debe aplicarse *muy lentamente*, durante unos diez minutos y en *decúbito lateral*. Es de gran importancia para el éxito el *momento de la administración del narcótico.*

Si se aplica la enema muy precozmente, el medica me ato trastorna el buen ritmo de las contracciones uterinas. En periodo muy adelantado del parto,

el recto, comprimido, sólo recibe el líquido que puede ser ins-tilado.

El momento oportuno es al iniciarse el período expulsivo en la primípara, cuando el feto, impulsado por regular actividad contráctil del útero no ha descendido aún del todo en la excavación. En las múltiparas la enema debe ser más precoz: cuando la dilatación del cuello alcanza 4 centímetros de diámetro.

Según el autor, la enema debe preceder unas dos horas a la expulsión del feto.

He aquí el tiempo que trascurió entre la administración de la enema y el momento en que se produjo el parto: en 316 por 100 de los casos, una hora; en 42,4 por 100, media a dos horas; 10,8 por 100, tres o más; horas.

La recomendación de E Kahn, de que se administre previamente luminal o morfina, no se observó siempre y el autor no encuentra inconveniente, en que se prescinda de estos componentes del método.

La composición de la mezcla para la enema es la siguiente:

Parafina líquida	.....	290 o. ;.
Éter sulfúrico puro	...	
Aceite de cacao c. s.		
para.....	660	\ c.

Las parturientas recibían de 150 a 170 c. c, según el peso de cada una.

El autor, para no perjudicar a la madre ni al feto, empleó siempre dosis algo más bajas de las prescritas por E. Kahn, que eran de 1 y medio c. c. de éter por kilogramo del peso.