

El Ulirón en el Tratamiento de la Gonorrea

W. y K. GENERICH, Kiel.

(Dermat. Wschr., 1938, NP 20,
página 541).

58 hombres (3 veces absceso de la próstata, 2 veces epididimitis, cowperitis, etc.), y 6 mujeres con gonorrea, algunos casos con complicaciones graves, fueron tratados por los autores con el Ulirón. Como método preparatorio se puede hacer uso de soluciones débiles (p. ej. Albargina al V₂ a 1 por 1000, compuestos de plata y tanino, etc.) No la plata, sino el empleo indebido de la plata dificulta la curación, pues la errónea remanencia de 10 minutos o el llenado excesivo de la uretra favorece la formación de infiltraciones, que tanto se opone a la curación por el Ulirón. Solamente se permite una remanencia insinuante (3, 5, etc. minutos). Después de un tratamiento local de 2 a 3 semanas,

se empieza la cura de Ulirón con 3 a 4 g. por 3 días. Para aumentar la tolerancia se da primero vitamina C desxtrosa. En ciertos casos, 8 días después se realizó un segundo golpe de Ulirón, en un caso bajo no interrumpido tratamiento local; en éste, como de costumbre, se prosiguió el tratamiento local 8 días *más* después de la cura de Ulirón. En el 89% de los "casos proporcionó la curación el primer golpe de Ulirón. En las recaídas hubo que contar con infiltraciones. Desde el segundo golpe, se hizo uso también de la vacuna antigonocócica. La tabla siguiente demuestra el resultado de la terapéutica por el Ulirón-(Ag):

CURACIÓN

Después de un golpe muy raras veces 40}. de Ulirón (20 tabl.,	Después de 2 golpes de Ulirón (varias veces con vacuna antigonocócica).	Después de 3 golpes de Ulirón (siempre con vacuna antigonocócica).
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

56

Los 64 casos curados, de modo que el éxito se elevó a 100%.

El Ulirón determinó disturbios 2 o 3 veces. En un caso se trató de un exantema **urticaria!**; en otro -en que el paciente había tomado 77,5 g; en 22 días -de una fuerte hemorragia intestinal

que fue combatida por vitamina C -1 - dextrosa. En un tercer enfermo, se observó cierto cansancio que pudo ser atribuido a una dosis total demasiado alta de Ulirón. Muy notable fue el efecto en los enfermos que llevaban ya meses enfermos, pade-