




Cromoblastomycosis a pequeño aumento se ven los hongos dentro de una célula gigante




Se observa intensa acantosis y hongos dentro de un microabsceso




Pus de fístula del paciente, en fresco, muestra varios elementos típicos de coccidioides immitis



Un elemento grande coccidioides immitis en extensión fresca de pus del testículo del conejo inoculado con pus de nuestro paciente




Microabscesos en testículo de conejo inoculado con pus de paciente con coccidioidosis



Obsérvese la endoesporilación de un elemento de coccidioidis en corte histológico de fístula del paciente




A gran aumento se observa mejor la endoesporilaci



Candidoides Inmitis en Sabou-
tura ambiente.—25 días
duración


Cultivo típico de C
raud, a temper
de



Extensión en fresco de cultivo de *Coccidioides immitis*. Se observa bien la segmentación de las hifas artrosporos oblongos.
Glyucosa agar de Sabouraud




Fístulas en pierna de paciente con coccidioidosis




Radiografía de pulmones del 11 de febrero de 1950, en donde se nota «área marcada opacidad y mal definidos contornos en región hiliar derecha con irradiaciones bronquiales hacia la periferia. Proceso menos acentuado en pulmón izquierdo



Fístulas cervicales en paciente con coccidioidosis



Corte histológico de un ganglio linfático de un paciente con blastomycosis pulmonar. Nótese blastomices dermatitides en el centro



Cultivo en Sabouraud de pus de elementos de blastomycosis americana




Blastomicosis norteamericana de miembros inferiores. Nótese otra placa en antebrazo derecho

ESPOROTRICOSIS

No ofrece ninguna novedad entre nosotros, pero vale la pena afirmar que tiene una incidencia elevada y se encuentra en todas las latitudes del país. En el tiempo a que se refiere este trabajo, hemos observado 12 casos repartidos así: 6 en el Departamento de Dermatología del Hospital San Felipe; 3 en nuestro Consultorio; y 3 en la Consulta Externa del mismo Hospital San Felipe.

La forma corriente de gomas en los trayectos linfáticos, es la que se observa con más frecuencia. Queremos destacar el hecho de que la poca costumbre de pensar en esta micosis, hace que pase desapercibida para muchos médicos generales en nuestro ambiente, pues nuestro servicio los ha recibido con los más variados diag-

Hemos observado 3 casos de Chancros Gigantes, 2 casos Ulcero-Queloides, 2 casos Eritemato Escamosos. Los 5 restantes del



Esporotricosis Forma
clínica: carcinomatoide



Esporotricosis de pierna. Un hilo
de sangre recorre las lesiones
Forma clínica: ulcerosa



Esporotricosis Forma
cicatrizal-retraetil



Esporotricosis Forma
clínica: carcinomatoide