

T A B L A 5

T R A T A M I E N T O S

EL 66% DE LOS CULTIVOS SE HICIERON NEGATIVOS
EN UN PROMEDIO DE UN MES CON LOS
SIGUIENTES TRATAMIENTOS:

MM + VIT C.	8
MM + GENT	3
A N + MM	2
SULFISOXAZOL	2
FURADANTINA	1

MM - MANDELATO DE METENAMINE

1 GR. q.i.d. HASTA TERMINAR EL EMBARAZO.

A N = ACIDO NALIDIXICO 1 GR q.i.d. x 15 DÍAS.

FURANDATINA = 100 mgr. q.i.d.

SULFISOXAZOL = 1 GR. q.i.d. x 1 MES

R E F E R E N C I A S

- 1).—■ Bacteriuria in Pregnancy. — Me Fadyen, J.R. et al; Obstet Gynecol., Br. Commonw. 86: 385-405, May 73.
- 2).— Bacteriuria in Pregnancy. A heterogeneous entity. ■—Heineman, H. S. >et al; Obstet Gynecol 41: 22-6, Jan 73.
- 3).— Pregnancy bacteriuria: The significanos of site of infection; Fairiy, K.F. et al. —Med. J. Aust. 2: 424-7, 1-Sep. 73.
- 4).— Urinary infection in pregnancy; Bailey, R.R. —New Zeal Med J. 71: 216-20- Apr. 70.
- 5).— Urinary tract infection in pregnancy; Markland, C; Minn Med 53: 737-40, July 70.
- 6).— Bacteriuria and hemoglobin le- véis in pregnancy. —Abramson, J.H. et al; JAMA 215: 1631-7, 8 mar 71.
- 7).— Bacteriuria in pregnancy and infectious in amniotic fluid and infant; Tves, J.A. et al. —Arch Dis Child 46: 82-4, Feb. 71.
- 8).— Bacteriuria in Pregnancy; Gruneberg R. N., et al; Br. Med J. 1: 107-8, 9 Jan. 71.
- 9).— Asymptomatic Bacteriuria in pr-egnaney. —Brumlitt W. et al Brit Med J. 3: 473, 23 Aug. 69.
- 10).— Kasseh 1957 Archives of Internal Medicine, 100, 194- 1960 105, 194.
- 11).— Treatment of bacteriuria in pregnancy; British Medical Journal 2: 631-2, 12 Dic. 70.
- 12).— Urinary Tract Infection and its Management; Kaye, D. M.D., 1972.