CISTICERCOSIS CEREBRAL EN NIÑOS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

*Dr. Rigoberto Cuéllar **

*Dra. Jackeline Wood de Bush ***

INTRODUCCIÓN:

La cisticercosis cerebral, se define como la presencia de la larva enquistada de *Taenia Solium* en el sistema nervioso central, en sus cavidades o en sus envolturas.

Sobre cisticercosis cerebral en niños, la literatura mundial es escasa, y hasta el momento actual sólo existen cuatro artículos publicados (1, 5, 6, 7).

Como en todos los padecimientos, existen diferencias entre la patología del adulto y la del niño, y por otro lado el pésimo nivel de salubridad y educación en que se encuentra nuestro país, nos obliga cada día más a reportar los padecimientos propios de este sub-desarrollo de tal forma que el médico general piense en estas entidades y pueda hacer un abordaje adecuado del problema.

Existe una clasificación anatomopatológica de la Cisticercosis cerebral y que la divide en:

1. Cisticercosis ventricular
2. Cisticercosis parenquimatosa
3. Cisticercosis subaracnoidea
4. Cisticercosis mixta.

Por otro lado, el Dr. López Hernández, considera de mucha utilidad en el paciente pediátrico clasifi-

* Neurólogo Infantil, Sala de Neurología y Neurocirugía
Pediátrica Hospital Escuela.

** Residente de primer año en la especialización de Pediatría

car a la cisticercosis desde el punto de vista clínico radiológico de la siguiente manera:

1. Cisticercosis cerebral asintomática
2. Cisticercosis cerebral con cráneo hipertensivo
 - a) Con datos de focalización
 - b) Sin datos de focalización.
3. Cisticercosis cerebral clasificada
 - a) Con crisis convulsivas
 - b) Sin crisis convulsivas
4. Formas mixtas.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se revisaron en una forma retrospectiva y prospectiva 20 pacientes con diagnóstica o de cisticercosis cerebral y vistos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras, durante el período de 1978 a 1985 y se hizo un análisis de un gran número de variables como ser sexo, distribución por edades, procedencia, signos y síntomas más frecuentes, evolución de los signos y síntomas durante su seguimiento en la consulta externa, evaluación de la utilidad de la prueba inmunológica ELISA, en suero y L.C.R., anomalías en el LCR, importancia de los estudios neuroradiológicos como ser Rx simple de cráneo, arteriografía carotídea y tomografía axial computarizada de cerebro, EEG y utilidad de los medicamentos administrados.

RESULTADOS:

Ver cuadros No. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14.

CUADRO No. 2
DISTRIBUCION POR SEXO

SEXO	No. DE CASOS	o/o
M	11	55
F	9	45
TOTAL	20	100

CUADRO No. 4
1978 - 1985

DEPARTAMENTO	No. DE CASOS	o/o
FRANCISCO MORAZAN	10	50
EL PARAISO	2	10
OLANCHO	2	10
ATLANTIDA	1	5
CHOLUTECA	1	5
CORTES	1	5
VALLE	1	5
YORO	1	5
NO CONSIGNADO	1	5
TOTAL	20	100

CUADRO No. 5
SINTOMAS Y SIGNOS MAS FRECUENTES

SINTOMAS Y SIGNOS	PRESENTE No. CASOS	o/o
VOMITOS	18	90
CONVULSIONES	16	75
CEFALEAS	14	70
PAPIEDEMA	4	20
MIALGIAS	2	10
TRASTORNOS VISUALES	2	10
TRASTORNOS PSICOTICOS	2	10
MARCHA ATAXICA	1	5

CUADRO No. 5-B

SINTOMAS Y SIGNOS	MEJORADO	o/o
VOMITOS	18	90
CONVULSIONES	13	65
CEFALEAS	13	65
PAPIEDEMA	4	20
MIALGIAS	2	10
TRASTORNOS PSICOTICOS	2	10
MARCHAS ATAXICAS	1	5
TRASTORNOS VISUALES	0	0

CUADRO No. 6

ESTUDIO INMUNOLOGICO (ELISA) EN SUERO Y LCR

PRUEBA (ELISA)	No. CASOS	o/o
SI SE PRACTICO	10	50
NO SE PRACTICO	10	50
TOTAL	20	100

RESULTADOS	SUERO	LCR
POSITIVIDAD	4	3
NEGATIVIDAD	6	7
TOTAL	10	10

CUADRO No. 7

TITULOS DE ANTICUERPOS (ELISA)

TITULOS	1:20		1:40		1:80		1:160		1:320		MAYOR DE 1:500	
	S	LCR	S	LCR	S	LCR	S	LCR	S	LCR	S	LCR
No. CASOS	1	0	1	0	2	0	1	1	1	0	2	2
TOTAL	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2		

CUADRO No. 8
ANORMALIDADES EN EL L.C.R.

L.C.R.	HALLAZGOS			
	GLUCOSA	POTREINAS	CELULAS	EOSINOFILOS
0	N	0	R	M
3	BAJA	NORMAL	NORMAL	NEGATIVO
4	NORMAL	ALTAS	NORMAL	NEGATIVO
4	BAJA	ALTAS	NORMAL	NEGATIVO
1	NORMAL	ALTAS	ALTAS	POSITIVO

20

CUADRO No. 9

RX CRANEO	20	100
EEG	12	60
TAC	10	50
ARTERIOGRAFIA	6	30

CUADRO No. 10

HALLAZGOS RX DE CRANEO	No. CASOS	o/o
SEPARACION SUTURAS	11	55
CALCIFICACIONES	6	30
NORMAL	3	15
TOTAL	20	100

CUADRO No. 11

T A C

HALLAZGOS	No. CASOS	o/o
CALCIFICACIONES	5	50
EDEMA CEREBRAL	3	30
AREAS FOCALES DE HIPERCAPT.	2	20
TOTAL	10	100

HALLAZGOS EN ARTERIOGRAFIA

CUADRO No. 12

HALLAZGOS	No. CASOS	o/o
NORMAL	6	100
NORMAL	0	0
TOTAL	6	100

HALLAZGOS EN E.E.G.
CUADRO No. 13

HALLAZGOS	No. CASOS	o/o
NORMAL	6	50
SIGNOS DE SUFRIMIENTO CEREBRAL DE ESTRUCTURAS MEDIAS Y PROFUNDAS	4	33.3
ACTIVIDAD PAROXISTICA TEMPORAL IZQUIERDA	2	16.6
TOTAL	12	99.9

CUADRO No. 14
TRATAMIENTO USADO EN 20 CASOS DE
CISTICERCOSIS CEREBRAL EN NIÑOS
EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

MEDICAMENTOS	No. CASOS	o/o
EPAMIN	8	40
FENOBARBITAL	6	30
DEXAMETASONA	5	25
CYSTICIDE	4	20
TEGRETOL	3	15
NO TX.	2	10
PREDNISONA	1	5
DIAMOX	1	5
MELLERIL	1	5

COMENTARIOS:

- Observamos, que entre más se sospecha el diagnóstico, el número de casos va aumentando por año.
- La incidencia de la enfermedad en este estudio es igual en ambos sexos, no encontrando diferencias estadísticamente significativas.
- El mayor número de casos se detectó en niños mayores de 8 años lo que concuerda con lo reportado en la literatura mundial.
- El mayor número de casos procede del Departamento de Francisco Morazán debido a la accesibilidad al hospital, en comparación al resto del país.

No hay casos reportados del Occidente, posiblemente debido a que estos pacientes acuden a países vecinos como El Salvador y Guatemala.
- Los pacientes con cisticercosis cerebral generalmente consultan por síndrome de hipertensión intracraneala y síndrome convulsivo.
- Durante la evolución de la enfermedad hubo remisión de casi la totalidad de los síntomas y signos más frecuentes, lo que nos habla que el padecimiento en el niño es menos agresivo que en el adulto.
- En nuestro estudio solamente 4 pacientes tuvieron títulos de anticuerpos significativos (20o/o) lo cual puede explicarse por la variedad de cisticercosis más frecuente en el niño (parenquimatosa y la presencia de enfermedad crónica).
- En el LCR 3 pacientes tuvieron positiva la prueba de ELISA.
- Las alteraciones globales en el LCR constituyen 12 de 20; sin embargo, solamente un caso presentó pleocitosis y eosinófilos. Lo anterior, comparado con estudios previos, hay concordancia en que aproximadamente 1 de cada dos líquidos cefalorraquídeos tienen alteraciones, pero es muy raro, contrario a los adultos la presencia de eosinófilos.
- Los estudios de Rx de cráneo, TAC cerebral, arteriograma carotideo, y EEG fueron los más frecuentemente practicados.
- 17 pacientes mostraron alguna alteración en las placas simples de cráneo, 6 tuvieron calcificaciones, las cuales hacen sospechar la enfermedad. (Ver cuadro No. 10).
- La arteriografía carotídea, demostró ser poco útil en el diagnóstico de la enfermedad ya que fue normal en los casos a quienes se les practicó.

13 La tomografía axial computarizada de cerebro, fue el examen más valioso en el diagnóstico, ya que sugirió enfermedad en todos los casos a los cuales se les practicó (Ver fig. No. 1, 2,3 y 4).

14. El EEG fue hecho a 12 pacientes de los cuales 6 fueron normales, los 6 que mostraron patolo-

gías, 4 de ellos dieron manifestaciones de proceso encefálico difuso y dos focalizaron a región temporal.

15. El prazicuantel (cysticide) se usó en 4 pacientes, siendo su evolución desde el punto de vista clínico semejante al resto de los mismos.

Fig. No. 1
ETAPA I
Cisticercosis Cerebral. Edema
Cerebral Difuso

Fig. No. 3
ETAPA IV
Calcificaciones

Fig. No. 2
ETAPA II
Areas focales de hipercaptación
en forma redondeada.

Fig. No. 4
Pseudotumor Cisticercoso

BIBLIOGRAFÍA

1. De la Torre J. A., Rentería G., Cisneros F. Cisticercosis Cerebral en el niño Bol. MED. Hosp. Inf. Mex. 11:643-54, 1945.
2. Inoue Y., Takirato K., Niyamoto T. Etal Sequential Computed Tomography Scans in acute cerebral infantion radiology. 135:655-62, 1980.
3. Londi S. Causes of Hipertensión in the Young Pediatric Clinic North Am. 23, 55-61, 1978.
4. Lombardo L., Mateos J. H., Estanol B. La Cisticercosis Cerebral en México. Gac. Med. Mex. 181:1-16, 1982.
5. López Hernández A. Cedillo. Cisticercosis Intracraniana en los niños. Análisis de 48 casos. Rev. Med. Pediatrics 45:277-85, 1976.
6. López Hernández A. Clinical Manifestations and Sequential Computed Tomography Scans of Cerebral Computed Tomography Scans of Cerebral Cisticercosis in Childhood. Brain Dev. Dev. 1983: 5:269-77.
7. López Hernández, Garaisar, Carmen "Childhood Cerebral Cysticercosis: Clinical Features and Computed Tomographic Findings in 89, Mexican children. The Canadian Journal of Neurological Sciences Nov. 1982.
8. Macías Sánchez R., Ordóñez de M.S. Cisticercosis Cerebral, diagnóstico clínico, Radiológico y Laboratorio, pronóstico. Análisis de 86 casos: Mex. 35:6-4, 1970.
9. Piza J. Fernández A. Soto M. García A. Cisticercosis Cerebral. Estudio Anatomoclínico de 24 casos en Costa Rica. Acta Med. Cost. 10:5-17, 1967.
10. Schenone H. Ramírez R. Rojas A. Aspectos Epidemiológicos de la Neurocisticercosis en América Latina Bol. Chileno Parasitolog. 3:28:61-72, 1973.
11. Veeh, Segal H—D Miller C. Unusual Neurological Features of Intracranial Cysticercosis. Radiology 137:397-407, 1980.