

IMAGEN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Signo de la doble burbuja

María Fátima Vallecillo Jorge Erlanger Becerra**




Figura No. 1. Toma ultrasonográfica donde se observa la imagen de doble burbuja gástrica.



Figura No. 2. Radiografía toracoabdominal donde se visualiza la obstrucción a nivel duodenal.

Paciente femenina de 26 años, con antecedentes gineco-obstétricos de G 4, P1, A2, HV 1, con embarazo de 38 semanas y 4 días por fecha de última menstruación, a la cual se le realizó rastreo ultrasonográfico por presentar altura de fondo uterino de 40 centímetros, no tuvo controles ultrasonográficos previos. En el corte trasversal de ultrasonido abdominal se visualizó la imagen de **doble burbuja gástrica** y polihidramnios secundario, la cual es un hallazgo que se documenta en la atresia duodenal, a su vez es un marcador ultrasonográfico para síndrome de Down, en el que se presenta en el 30 % de los casos. Al nacimiento por los hallazgos fenotípicos se le diagnosticó al recién nacido Síndrome de Down, no se realizó cariotipo por presentar sepsis neonatal y fallecer, familiares no autorizan la autopsia. Se tomó Radiografía donde se visualizó la imagen de doble burbuja gástrica.

* Especialista en Medicina Materno Fetal
Dirigir correspondencia a: claudoc05@yahoo.com