

**COLEGIO MEDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA
REVISTA MÉDICA HONDURENA**

Cuestionario del Contenido del Volumen 76 No. 4

Estimado(a) colega: al contestar este cuestionario la Revista Médica Hondureña te ofrece la oportunidad que obtengas puntos oro CENEMEC. A partir del volumen 74 No. 4 en la Revista Médica Hondureña aparece un cuestionario sobre el contenido de la Revista, cuyas respuestas a partir del volumen 75 aparecen en el número siguiente. Contesta el cuestionario, desprende la hoja, al completar los cuatro cuestionarios correspondientes a los cuatro números de cada volumen preséntalos en la oficina de CENEMEC.

Nombre _____

Número de Colegiación _____

Folio _____

1. En relación al artículo escrito por Palma R, Pineda E, sobre Impacto de la Clínica de Atención Integral de Personas con Hipertensión Arterial del Instituto Nacional Cardiopulmonar, es correcto afirmar:

- a. El 100% de los pacientes que participaron en el estudio tenían control adecuado de su Hipertensión Arterial.
- b. La mayoría de los pacientes investigados no conocían el nombre de su enfermedad.
- c. El objetivo de la clínica de atención integral fue analizar la efectividad del enfoque de atención integral y ampliar su cobertura.
- d. Los pacientes participantes en el estudio además de hipertensión Arterial tenían diabetes mellitus.
- e. Todas las anteriores son correctas.

2. Con respecto al artículo de Caracterización de Pacientes con Leucemia Diagnosticada en el Departamento de Patología y Hematoncología del Hospital Escuela, escrito por Girón D y col, es correcto afirmar:

- a. La mayoría de pacientes con leucemia que se diagnosticaron en el Hospital Escuela eran adultos.
- b. El sexo que predominó en el estudio fue femenino.
- c. El motivo de consulta más frecuente fue la pérdida de peso.
- d. La edad más frecuente de presentación es en la edad pediátrica.
- e. Ninguna es correcta.

3. Del artículo de revisión sobre el manejo de la crisis asmática, escrito por Lanza M, es correcto afirmar:

- a. El único factor desencadenante de las crisis asmáticas es la infección.
- b. El espirómetro es la única herramienta útil para medir el grado de obstrucción de la vía aérea.
- c. La piedra angular del manejo de la crisis asmática son los broncodilatadores de acción corta.
- d. Visitas frecuentes a sala de emergencia y las hospitalizaciones son los únicos Factores asociados a mortalidad.
- e. Todas las anteriores son correctas.

4. Del artículo sobre Tratamiento de las Taquiarritmias Ventriculares Malignas con Desfibrilador Implantable, escrito por López H y col, es correcto afirmar:

- a. El primer desfibrilador implantable se colocó en un paciente masculino en el año de 1980.
- b. No se necesita de personal capacitado y equipo especializado para la implantación de estos dispositivos.
- c. Los dispositivos pueden ser usados solo en prevención primaria.
- d. Los dispositivos no se pueden usar en forma conjunta con la terapia médica.
- e. El DCI actualmente se usa como terapia de primera línea para el manejo de taquiarritmias.

5. Del artículo de revisión de broncoaspiración silenciosa en niños, escrito por Mejía O, es correcto afirmar:

- a. Es un artículo científico original.
- b. La paciente que se presenta es una femenina de 30 años.
- c. La Fibrobroncoscopía flexible sirvió para establecer el diagnóstico de aspiración Crónica silenciosa basada en la presencia de macrófagos cargados de lípidos en el lavado bronco alveolar.
- d. El tratamiento en pacientes con bronco aspiración crónica silenciosa es inicialmente quirúrgico.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.

6. En relación al artículo escrito por Lizardo J. sobre resección toracoscópica de un quiste broncogénico, es correcto afirmar:

- a. Es un estudio retrospectivo de casos y controles.
- b. La resección quirúrgica en quiste broncogénico es el tratamiento de elección aún en pacientes asintomáticos.
- c. El quiste broncogénico es una lesión adquirida.
- d. Todas las anteriores son correctas.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DEL CONTENIDO DEL VOL. 76 No. 3

Respuesta a la pregunta No 1. La respuesta es a. Para el tratamiento definitivo de la escabiosis se debe indicar tratamiento al paciente, las personas en contacto cercano al paciente, las prendas de vestir y ropa de cama. La vía de transmisión es por contacto directo de piel a piel y de forma indirecta a través del contacto con ropas y camas infectadas y otros fomites. Las manifestaciones clínicas varían según la edad y el estado inmunológico del paciente, y una de las características más importantes es el prurito nocturno. La permetrina constituye el tratamiento de primera línea y se puede indicar con seguridad a partir de los dos meses de edad.

Respuesta a la pregunta No 2. La respuesta es c. Para el diagnóstico definitivo de lupus eritematoso cutáneo subagudo se necesita la correlación entre los hallazgos clínicos, estudio histopatológico, inmunología e inmunofluorescencia directa. Se desarrolla en la vida adulta alrededor de la 5ta década y excepcionalmente en edad pediátrica, como la paciente de 11 años objeto de este artículo, la cual presentaba datos clínicos e histopatológicos sugestivos de esta enfermedad y anticuerpos Anti-Ro positivos, estudio que sustenta con firmeza este diagnóstico. Sólo un 50% de los pacientes cumplen con criterios de lupus eritematoso sistémico.

Respuesta a la pregunta No. 3. La respuesta es d. Los siringomas se desarrollan en la pubertad y excepcionalmente en adultos mayores, las lesiones se localizan en el área palpebral y menos frecuentemente en extremidades superiores, como en la paciente reportada. Los siringomas son tumores benignos que se originan en el acrosiringio, el cuadro clínico no es específico por lo que se debe realizar biopsia para confirmar el diagnóstico. El tratamiento por lo general no es necesario, los tratamientos tópicos con esteroides o ácido retinoico no son efectivos, los quirúrgicos y químicos son más efectivos pero con riesgo de cicatrización defectuosa.

Respuesta a la pregunta No. 4. La respuesta es e. Todos los incisos son correctos ya que el artículo escrito por Lizardo G. se refiere a leishmaniasis cutánea atípica, la identificación de las especies por análisis insoenzimático se realizó en 11 de los 27 pacientes incluidos en el estudio, identificándose *Leishmania chagasi* en 10 y *Leishmania mexicana* en 1, la mayoría de los pacientes procedían de la región sur del país (Valle y Choluteca). Este tipo de leishmaniasis afecta predominantemente la cara y las extremidades.

Respuesta a la pregunta No. 5. La respuesta es c. La mayoría de niños atropellados por vehículo automotor fueron niños en edad escolar, del sexo masculino, atropellados en horas del día (en el lapso de las 10 a 14 horas) que entran y salen de la escuela; menos de la mitad recibieron atención paramédica en el sitio del accidente; el tiempo promedio de llegada al hospital fue de 1:48 horas; la mayoría fueron transportados al hospital por algún familiar. El diagnóstico más frecuente fue Traumatismo encéfalo craneano.