

**COLEGIO MEDICO DE HONDURAS  
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA  
REVISTA MÉDICA HONDURENA**

**RESPUESTAS  
Cuestionario del Contenido del Volumen 77 No. 3**

**Respuesta de la pregunta No. 1.** La correcta es b. Se realizó un estudio transversal descriptivo incluyendo a 56 pacientes con diagnóstico de ACV durante el período enero a diciembre del año 2006. La hipertensión arterial fue el antecedente de riesgo predominante (66%), seguido de la diabetes mellitus (26.7%). Los resultados muestran que el principal factor de riesgo para ACV en pacientes del IHSS continúa siendo la hipertensión arterial, predominando el ECV Isquémico.

**Respuesta a la pregunta No. 2.** La correcta es c. Se realizó un estudio donde el universo estuvo constituido por 200 niños desde cero hasta cinco años que ingresaron en el servicio con el diagnóstico de enfermedad diarreica aguda en el transcurso de una epidemia. Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a las madres y además se utilizó información de los expedientes clínicos de los pacientes, la conclusión de este estudio fue que los hallazgos clínicos y epidemiológicos encontrados en este grupo indican que las condiciones socioeconómicas se asocian a enfermedad diarreica.

**Respuesta a la pregunta No. 3.** La correcta es e. Las neoplasias apendiculares son sumamente raras y casi nunca se diagnostican antes de la cirugía, Los tumores carcinoides apendiculares son habitualmente asintomáticos. Su tratamiento es quirúrgico y tienen un buen pronóstico. Se presentó el caso de una paciente de 14 años de edad con cuadro clínico de apendicitis aguda y estudio anatomopatológico de pieza quirúrgica que confirmó un tumor de células endocrinas. Se enfatiza que es extremadamente importante el seguimiento de las conclusiones del examen histológico de pacientes sometidos a apendicetomía.

**Respuesta a la pregunta No. 4.** La correcta es d. Desde la aparición de los automóviles, la fractura esternal ha sido reportada con frecuencia creciente. El mecanismo clásico de lesión es el impacto directo del esternón con el volante del automóvil que desacelera súbitamente en una colisión. La fractura esternal está asociada a politraumatismo. Se reportó la casuística de 13 pacientes con diagnóstico de fractura esternal que ingresaron a la Emergencia de Cirugía del Hospital Escuela entre el 1 de enero de 1996 y el 30 de noviembre de 2008. El estudio concluyó que la buena evolución de los pacientes intervenidos apoya el beneficio del manejo quirúrgico.

**Respuesta a la pregunta No. 5.** La correcta es c. La apendicitis aguda es la patología más frecuente que requiere una intervención quirúrgica abdominal de urgencia en pediatría, representando hasta un 80% de todas las emergencias abdominales pediátricas, la primera apendicectomía conocida de la historia, la realizó en octubre de 1735 Claudius Amyand, médico de la Reina Ana de Inglaterra y cirujano londinense de los hospitales de Westminster y St. George. En las más recientes publicaciones bibliográficas sobre apendicitis se continúa concluyendo que el diagnóstico ha sido y continúa siendo clínico.

**Respuesta a la pregunta No. 6.** La correcta es e. El Programa de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria consiste en la prestación de servicios de salud integrados de calidad para la población asegurada que promueve mediante el trabajo en equipo una práctica clínica y de salud en el contexto familiar y comunitario. Su objetivo es brindar acciones de promoción de la salud, la prevención, control y la rehabilitación de la enfermedad en los diversos niveles de atención del IHSS y la comunidad, comenzó su operativización en la Clínica Periférica No. 2 del IHSS en Tegucigalpa y continúa extendiéndose progresivamente a cada unidad de salud a nivel nacional contando actualmente con 11 ciudades que lo están implementando.

**COLEGIO MEDICO DE HONDURAS  
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA  
REVISTA MÉDICA HONDURENA**

**Cuestionario del Contenido del Volumen 77 N° 4**

Estimado(a) colega: al contestar este cuestionario la Revista Médica Hondureña te ofrece la oportunidad que obtengas puntos oro CENEMEC. A partir del volumen 74 N° 4 en la Revista Médica Hondureña aparece un cuestionario sobre el contenido de la Revista, cuyas respuestas a partir del volumen 75 aparecen en el número siguiente. Contesta el cuestionario, desprende la hoja, al completar los cuatro cuestionarios correspondientes a los cuatro números de cada volumen preséntalos en la oficina de CENEMEC.

Nombre \_\_\_\_\_

Número de Colegiación \_\_\_\_\_

Folio \_\_\_\_\_

1. **En relación al artículo escrito por Sierra M, y col sobre Vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/ SIDA en zonas rurales de Honduras, es correcto afirmar:**
  - a. El objetivo del estudio fue determinar la vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/SIDA en Tegucigalpa
  - b. Es un artículo de revisión bibliográfica.
  - c. Honduras es el segundo país de Centro América más afectado por la infección del VIH con una prevalencia estimada de alrededor del 1% y con un patrón de transmisión de predominio heterosexual.
  - d. Los pacientes participantes en el estudio fueron 10,000 personas (48% hombres, 51% mujeres).
  - e. Todas las anteriores son correctas.
  
2. **Del artículo escrito por Sandoval E, Chavarria Y. Sobre Prevalencia y Características Clínico Epidemiológicas de los pacientes Adultos diagnosticados con VIH en la Clínica periférica N° 1 del IHSS, es correcto aseverar:**
  - a. Es un artículo Científico Original.
  - b. La forma de transmisión fue sexual predominando la forma heterosexual.
  - c. A 9739 pacientes se les realizó la prueba de ELISA para VIH/SIDA de los cuales 85 eran positivos.
  - d. Es un estudio descriptivo trasversal.
  - e. Todas son correctas.
  
3. **Con respecto al artículo de, Síndrome Neurocutáneos en la Consulta Neurológica escrito por Durón R y col, es correcto afirmar:**
  - a. Es un artículo Original.
  - b. Se identificaron 87 casos donde el sexo que predominó en el estudio fue Masculino.
  - c. Los síndromes neurocutáneos son trastornos genéticos que afectan simultáneamente a la piel, sus anexos y al sistema nervioso.
  - d. La edad más frecuente de presentación es en la edad pediátrica.
  - e. Ninguna es correcta.

**4. Sobre el caso de síndrome de Tako Tsubo reportado por M. Aguilar y col. no es cierto:**

- a. Es una entidad de reciente descripción, su importancia radica en que puede simular todos los hallazgos clínicos de un infarto agudo de miocardio de cara anterior.
- b. Hay muchos casos publicados en la literatura.
- c. Se realizó estudio de coronariografía de urgencia, ecocardiografía y niveles séricos de enzimas cardíacas, mostrando los cambios típicos del síndrome.
- d. Un ecocardiograma de control mostró la reversibilidad de esos cambios.

**5. Del Editorial “Los Profesionales de la Salud en la lucha Antitabaco, es Correcto afirmar:**

- a. La Alianza Hondureña Antitabaco”, está integrada por más de 20 organizaciones, asociaciones médicas, otros gremios profesionales y grupos defensores de la salud, medio ambiente y adicciones particularmente en jóvenes.
- b. Según estadísticas del IHADFA, un 33% de la población fuma, con una tendencia marcada a la feminización.
- c. Según estadística del IHADFA la adicción al tabaco es cada vez más temprana, pues a los 8 años un gran porcentaje de nuestra niñez ha fumado su primer cigarrillo.
- d. Todas las anteriores son correctas.