

PRURIGO NODULAR

Nodular prurigo

Miriam González,¹ Diana García²

¹Dermatóloga, Servicio de Dermatología, Hospital Escuela, Tegucigalpa.

²Residente de Tercer año del Post grado de Dermatología, Hospital Escuela/ Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



Figura 1




Figura 2

Paciente femenino de 23 años de edad con pápulas y nódulos indurados de 12 años de evolución, distribuidos en forma simétrica en brazos, tronco, miembros inferiores y cara, pruriginosos. **Figura 1.-A** Nódulos hiperpigmentados y algunos con superficie queratósica de 1-2cm de diámetro, en espalda y cara posterior de brazos. **Figura 1.-B** Muestra nódulos eritematosos, duros a la palpación en dorso de antebrazos y manos. El prurigo nodular es una dermatosis crónica de etiología multifactorial, se han implicado factores emocionales, atópicos y de hipersensibilidad. Estudios recientes han demostrado aumento de neuropéptidos en las lesiones, que podrían ser los desencadenantes de la respuesta dermoepidérmica y neural en las lesiones; igualmente, se ha encontrado niveles elevados de Inmunoglobulina E sérica. Es una dermatosis de difícil manejo, se han empleado numerosos fármacos tópicos, intralesionales, sistémicos, crioterapia y fototerapia, solos o combinados con resultados poco alentadores, en la actualidad la terapia con UVB de banda estrecha parece ser prometedora. **Figura 2.** La microfotografía histológica revela un corte de piel que revela en la epidermis hiperqueratosis compacta y estrato de Malpighio hiperplásico; la dermis presenta fibrosis e hipertrofia de las estructuras nerviosas en la porción superior y moderado infiltrado linfocitario perivascular en la porción media.